

## **Gabarito Discursiva Acesso Direto**

### **Questão 1:**

- a) Sorologias virais (principalmente relacionadas a Hepatite B) e rx de tórax.
- b) Pacientes com teste PPD > que 5 mm e RX de tórax normal devem receber isoniazida por 6 meses, podendo o anti-TNF ser iniciado após o 1.º mês desse tratamento.

### **Questão 2:**

- a) IPMN (DUCTO PRINCIPAL)
- b) TC abdome com contraste , RNM de abdome superior, ecoendoscopia
- c) Duodenopancreatectomia

### **Questão 3:**

- a) as alterações periódicas presentes são as desacelerações tardias
- b) seria a categoria III, porque há ausência de variabilidade e presença de desacelerações tardias recorrentes.
- c) As medidas de ressuscitação intrauterina seriam as instituídas. No caso em questão, as medidas mais importantes a serem adotadas são aquelas que visam a reestabelecer o fluxo adequado de sangue para o feto e a placenta, já que as desacelerações tardias estão relacionadas com a redução desse fluxo. Suspender a infusão da ocitocina e alterar a posição materna para decubito lateral esquerdo são as principais medidas com essa finalidade. Fornecer oxigênio inalatório à gestante também pode ser empregado com a finalidade de aumentar o gradiente materno-fetal de oxigênio e melhorar a variabilidade.
- d) Caso as medidas de ressuscitação intrauterina se mostrem infrutíferas na melhora do traçado, deve-se prontamente ultimar o nascimento, seja pelo parto operatório seja pela cesariana.

### **Questão 4:**

- 1) Sim --- Não havia nenhum sinal de gravidade.
- 2) Pneumococos, Haemophilus influenzae, Moraxella, Staphylococcus, Micoplasma , BK
- 3) Derrame Pleural- toracocentese para estudo do líquido pleural com cultura e Fazer a drenagem torácica em caso de Empiema.
- 4) Deve-se manter o esquema de Penicilina Cristalina ou Ampicilina e acompanhamento clínico rigoroso. Não havendo melhora em 72 h ou em caso de piora clínica trocar o esquema para Ceftriaxone + Oxacilina após coleta de Hemoculturas.